



CANCERUL DE COLON - RECT

Semne și simptome

- Sânge în materiile fecale, constipație sau diaree prelungită
- Dureri abdominale sau dureri la palpare
- Oricare modificare a obiceiurilor intestinale

Factori di risc

- Antecedente familiale de cancer sau de polipi la colon - rect
- Boli inflamatorii ale intestinului
- Dietă bogată în grăsimi și cu un sărac conținut în fibre
- Redusă activitate fizică
- Fum de țigară

Recomandări pentru screening

- Screening-ul este recomandat tuturor adulților între 50-75 ani
- Nu este indicat screening-ul nediscriminat la adulții între 76-85 ani
- Nu este necesar screening la adulții care au mai mult de 85 ani

Test de screening


- FOBT (teste de înaltă sensibilitate pentru descoperirea de sânge în materiile fecale)
- Sigmoidoscopia + FOBT
- Colonscopia
- Radiografie a colonului cu clismă opacă cu dublu contrast

Perioade pentru screening

- În fiecare an cu FOBT
- La fiecare 5 ani cu sigmoidoscopie și FOBT la fiecare 3 ani
- Din 10 în 10 ani cu colonscopie

Riscuri și beneficii ale screening-ului

- Vârsta 50-75 ani: beneficiile screening-ului depășesc riscurile
- Vârsta >75 ani: se reduce probabilitatea ca un diagnostic precoce să poată duce la o reducere a mortalității, considerând lunga perioadă de timp cuprinsă între dezvoltarea tumorii și diagnostic



RIFERIMENTI: Guide to Clinical Preventive Services 2014.

Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force. www.ahrq.gov

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: ottobre 2014.

TRADUZIONE: Mirela Rău

NOTĂ: Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului dumneavoastră.
De asemenea, la fel ca oricare alt document, are nevoie de o actualizare periodică.