

السيلان



الأسباب

يسبب المرض بكتيريا تدعى نيسيريا جونوريا ينتقل من شخص لآخر خلال العلاقات الجنسية أَلفميه، الشرجية، المهبلية، للرجال تنتقل العدوى حتى قبل الفذف المنوى، وبالعكس لا تنتقل العدوى عن طريق لمس الأشياء مثل المراحيض. يزداد خطر العدوى مع وجود شريك جنسى جديد أو تعدد الشركاء، أو وجود مرض جنسى آخر.

الأعراض

تختلف حسب مكان المرض وتختلف من الرجل للمرأة. فى الرجل والمرأة يحدث المرض فى الحالب، البلعوم، المستقيم. فى المرأة يحدث المرض فى الرحم، عنق الرحم، قناة فالوب، المبيض. فى الرجل يحدث المرض فى البروستاتا أو البربخ (الأنبوب ة الخارجية من الخصية). فى حالة عدوى البلعوم يظهر ألم فى الحلق، السيلان الفمى غالباً لا تكون له أعراض. تحدث العدوى من الأشخاص المصابون حتى فى غياب الأعراض.

العدوى فى المرأة. الأعراض :

- أكلان، إفرازات غير عادية من المهبل
- نزيف مهبلى
- ألم أو حرقان أثناء التبول
- أكلان أو إفرازات من فتحة الشرج
- ألم فى البطن

العدوى فى الرجل. الأعراض :

- ألم أثناء التبول
 - إفرازات لبنية من القضيب
 - ألم وتورم الخصية
- عدوى المستقيم تحدث غالباً عند المثليين، وتظهر الأعراض على هيئة إفرازات من فتحة الشرج، أمساك، ألم.

تشخيص السيلان

على عينة من البول أو عينة من عنق الرحم أو عينة من الحالب عند الذكر، تظهر النتيجة فى خلال 24 ساعة.


اختبارات الأمراض الجنسية الأخرى

فى وجود السيلان يوصى بعمل التحاليل الأخرى، للبحث عن مرض نقص المناعة المكتسبة، كلاميديا الكبد الوبائى ب، التريكوموناس، الزهري.

المضاعفات

السيلان عندما لا يعالج يسبب عدوى أخطر فى الرجل والمرأة وبالتحديد :

- عدوى المفاصل والتهاب المفاصل
- مرض التهاب الحوض فى المرأة، تنتشر العدوى من عنق الرحم للرحم نفسه ثم قنوات فالوب، وهذا يسبب عقم، وزيادة خطر الحمل خارج الرحم
- زيادة خطر العدوى باللايدز
- التهاب الخصية وتوابعها وبالتالي العقم



العلاج

نفس العلاج بالنسبة للمرأة أو الرجل. وهي عبارة عن حقنة واحدة أو أخذ مضاد حيوى بالفم لعدة أيام، ليس من الضروري إعادة الاختبار عند الانتهاء من دورة العلاج. لابد من عمل الاختبار ثانياً إذا استمرت الأعراض أو يكون الشخص تحت خطر العدوى ثانياً. علاج الشريك الجنسي: يوصى بعلاج الشريك الجنسي، أثناء العلاج لابد من الامتناع عن العلاقات الجنسية، العدوى مرة أخرى ممكن أن تحدث.

الوقاية

- استعمال العازل الطبي فى كل علاقة جنسية
- الامتناع عن العلاقات الجنسية عند ظهور أى إفرازات غير عادية، حرقان أثناء البول، بقع أو تقرحات على الأعضاء الجنسية
- استشارة الطبيب فى ضرورة عمل الاختبارات، خاصة إذا كانت العلاقات الجنسية مع شريك ثابت أى خطورة قليلة للعدوى
- أخذ رأى الطبيب فى حالة وجود أعراض السيلان أو أى مرض جنسى آخر

RIFERIMENTI: <http://www.uptodate.com>

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mariam El Gendi

ملاحظات: هذه الوثيقة تعرض المعلومات فقط وليس المقصد منها أن تحل محلما يقرره الطبيب. وأيضاً، لأنك الوثيقة تتطلب تحديثها بانتظام من حين لآخر.