



GONOREA

Cauze

Boala este provocată de o bacterie numită *Neisseria gonorrhoeae*, transmisă de la o persoană la alta prin raport sexual oral, vaginal sau anal. Bărbatul poate transmite infecția chiar și în absența ejaculării; dimpotrivă, infecția nu se transmite prin contactul cu obiecte cum ar fi colacul de la WC.

Riscul crește odată cu un nou partener sexual, cu parteneri sexuali multipli sau în prezența unei alte boli cu transmisie sexuală.

Simptome

Depind de poarta de intrare a infecției și sunt diferite de la bărbați la femei. Atât bărbatul cât și femeia pot să dezvolte o infecție la nivel de uretră, de faringe și de rect. La femei infecția se poate manifesta la nivelul colului uterin, al uterului, al trompelor lui Falloppio și al ovarelor. La bărbați sunt afectate prostata și epididimul.

Infecția faringelui poate provoca dureri în gât; gonoreea orală este în general asimptomatică.

Este de asemenea posibil ca persoanele infectate să fie contagioase chiar și în absența simptomelor.

Infecția la femei. Simptomele cuprind:

- Mâncărime sau scurgeri vaginale anormale
- Sângerare pe cale vaginală
- Durere sau usturime în timpul urinării
- Mâncărime sau scurgeri din anus
- Dureri abdominale

Infecția la bărbați. Simptomele cuprind:

- Durere în timpul urinării
- Scurgeri albicioase din penis
- Durere sau umflătura unui testicul

Infectarea rectului afectează mai ales homosexualii; simptomele cuprind scurgeri rectale, constipație și durere.

Diagnosticul de Gonoree

Se efectuează în baza unui test pe un campion de urină sau pe un tampon din secrețiile recoltate la nivelul colului uterin sau al uretrei masculine. Rezultatele testului sunt disponibile în 24 de ore.


Screening pentru alte boli cu transmisie sexuală

În prezența gonoreei, sunt recomandate teste pentru alte boli cu transmisie sexuală. Dintre acestea fac parte: HIV, Chlamydia, HBV, tricomonas și sifilis.

Complicații

Gonoreea netratată poate provoca infecții grave atât la bărbați cât și la femei. În particular:

- infecții articulare și artrită
- Boală inflamatorie pelvică atunci când, la femei, infecția se extinde de la colul uterin la uter și la trompe. Lezionarea trompelor poate provoca pierderea fertilității și mărește riscul de sarcină ectopică (extrauterină).
- Mărirea riscului de contagiare cu HIV
- Epididimită la bărbați, cu pierdere consecutivă a fertilității.



Tratament

Este același pentru bărbați și femei. Constă într-o singură injecție, sau în administrarea de antibiotice pe cale orală timp de câteva zile. Nu este necesar să se repete analizele la sfârșitul terapiei.

Un nou test este recomandat însă atunci când simptomele persistă sau când persoana este expusă la risc de reinfectare.

Tratamentul partenerului sexual. Cura este recomandată și pentru partener; pe perioada tratamentului ar trebui să se evite contactele sexuale. Reinfectarea cu *N. gonorrhoeae* este posibilă.

Prevenire

- Folosirea prezervativului la fiecare raport sexual
- Evitarea raporturilor sexuale în cazul în care partenerul prezintă scurgeri anormale, usturime la urinare, Pete sau ulceratii la nivel genital.
- Analiză a utilității testului, mai ales în cazul unei relații stabile în care deci riscul de boli cu transmisie sexuală este scăzut
- Solicitarea asistenței medicale în prezența de simptome de gonoree sau de alte boli cu transmisie sexuală

RIFERIMENTI: <http://www.uptodate.com>

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mirela Rău

NOTĂ: Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului dumneavoastră. De asemenea, la fel ca oricare alt document, are nevoie de o actualizare periodică.