



SIFILIS

Contagiarea are loc în timpul contactului sexual. Este de asemenea posibil ca femeia însărcinată să transmită infecția fătului. Sifilisul prezintă diverse stadii, fiecare cu simptome caracteristice. În ordinea apariției, stadiile sunt numite:

- Sifilis primar
- Sifilis secundar
- Sifilis latent
- Sifilis tardiv (terțiar)

Sifilis Primar

Reprezintă stadiul inițial al bolii. Simptomele dispar după 2-3 săptămâni de la contagiare și sunt caracterizate de apariția unui șancru (umflătură) la nivelul porții de intrare a germenului. Șancrul nu este dureros și se poate transforma într-o mică ulcerație cu marginile umflate. Ulcerația poate apărea la nivelul penisului, al vulvei, al anusului sau în sedii mai dificil de identificat, cum ar fi partea posterioară a faringelui, în interiorul vaginului sau în rect. Dat fiind că șancrul sifilitic poate să dispară de la sine în câteva săptămâni, e posibil ca persoane infectate să nu fie diagnosticate și să nu facă nici un tratament.



Sifilis Secundar

Corespunde celui de-al doilea stadiu al infecției. Se manifestă după câteva săptămâni sau luni la 25% dintre persoanele cărora nu le-a fost tratată infecția primară. Simptomele cuprind:

- Erupecție generalizată
- Pete mari, umflate, gri sau albicioase în zonele calde-umide ale corpului
- Febră
- Dureri de cap, în gât, dureri musculare sau simptome similare cu cele ale gripei
- Scădere în greutate
- Umflarea ganglionilor limfatici de la nivelul gâtului, al axilelor sau al zonei inghinale



Sifilis Latent

În acest stadiu simptomele sunt absente iar marea majoritate a persoanelor afectate poate ignora faptul că a fost contagiată.

Sifilis Tardiv

În această fază, chemată și sifilis terțiar, pot apărea probleme la nivelul inimii, al creierului, al ochilor sau al altor organe.



Neurosifilis

Se poate manifesta pe perioada oricărui stadiu al bolii și afectează creierul, măduva spinării și țesuturile din jurul acestora.

Simptomele neurosifilisului cuprind:

- Cefalee, stare confuzională
- Amețeală și vomă
- Rigiditate a gâtului
- Reducerea sau pierderea vederii

Suspectând prezența de neurosifilis, medicul ar putea practica o injecție lombară; prin intermediul acesteia este recoltată o mostră din lichidul care înconjoară țesutul nervos, mostră care este trimisă la laborator pentru a se descoperi prezența de bacterii care provoacă sifilisul.

Diagnosticul de Sifilis

Există teste hematologice care permit stabilirea diagnosticului.

Persoana care prezintă simptome de sifilis precum și partenerul acesteia ar trebui să ceară sfatul medicului pentru a stabili un diagnostic exact și pentru a putea exclude eventuale alte boli cu transmisie pe cale sexuală.

Terapia

Sifilisul este tratat în general cu un antibiotic numit penicilină. Durata tratamentului depinde de stadiul infecției. Persoanele alergice la penicilină vor fi tratate cu un antibiotic diferit, prescris de medic.

Prevenire

Riscul de infecție poate fi redus:

- Utilizând prezervativul cu ocazia fiecărui raport sexual
- Evitând raporturi sexuale cu parteneri care prezintă simptome de sifilis
- Practicând abținerea sexuală

RIFERIMENTI: <http://www.uptodate.com>

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mirela Rău

NOTĂ: Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului dumneavoastră.
De asemenea, la fel ca oricare alt document, are nevoie de o actualizare periodică.