

# الفصل مرض نقص المناعة المكتسبة



## اختبار مرض نقص المناعة المكتسبة رؤية جماعية

هو اختبار لتشخيص العدو بفيروس HIV. هناك أشخاص لا يدون عملاً لاختبار لهم ليعلمون أنهم متعرضون لخطر العدو وبالمرضى أشخاصاً آخرين ينجونوا عملاً لاختبار سبباً خوفاً من النتيجة. لا بد من التشجيع على عملاً لاختبار لأنهم نحننا الحظ بسبب تقدم العلاجات حال العدو الفيروس وسيمكننا تحسين نوعية الحياة للشخص المرصو إقلاً لا حتماً لا العدو بل الآخرين.

## طرق عملاً لاختبار

**الاختبار السريع:** باستعمال السائل اللعاب أو الدم فقط وخز في الأصبع. فخلال 5 - 40 دقيقة نحصل على النتيجة، لذلك يستطيع الشخص انتظار النتيجة فممكن عملاً لاختبار.

إعادة الاختبار غير ضرورية إذا كانت النتيجة سلبية، لكن في حالة نتيجة موجبة يجب التأكد باختبار آخر.

### الاختبار الروتيني:

باستخدام عينة دم مأخوذة من الوريد، ونحصل على النتيجة فخلال أيام.

### اختبار مجهول الاسم:

معناه عدم ظهور اسم المرصو استبداله بإشارة أو رقم.

### الاختبار المنزلي:

يباع في الصيدليات (خارج إيطاليا) لعملاً لاختبار في المنزل ليكمية دم صغيرة مأخوذة من الأصبع وفردها على رقعة شحوب ترسل للمعمل، ترسل النتيجة للمرصو ويضدو ناسم.

**تتال عملاً لاختبار:** يوصى بعملاً لاختبار من سن 13 - 64

عام، وفي حالة وجود تعرض للخطر (شريك جديد مثلاً).

يعاد عملاً لاختبار الأشخاص المعرضة للخطر العالمهم (المثليين، مدمن المخدرات، علاقات جنسية مع أشخاص كثيرين، شريك

رخصاً لإيدز) يجعل عليهم عملاً لاختبار كل 6 - 12 شهراً.

## اختبار نقص المناعة ونتائج

**نتيجة سلبية:** العدو غير محتملة، على كل حال إذا كان هناك شك عند الشخص يعاد الاختبار بعد 6-12-24 أسبوع.

الاختبار الأول قد يكون سلبياً ذلك لأن الجسم لم يتكون فيها الأجسام المضادة.

**نتيجة إيجابية:** لا بد من تأكيدها باختبار آخر (اختبار تأكيد).

لكننا اختبار إيجابياً كاذباً أو أمياً يحدث، تقر ببيانات المرصو ضللتنا الاختبار مرة ثانية، وهذا الحقيقة شيء خطير لأن في حالة عدم العلاجات قد مضاعفات خطيرة وتكوننا احتمال انتقال العدو بل الآخرين عالية.

### النتيجة الغير محددة:

عندما تكون النتيجة غير واضحة بالسلب أو الإيجاب فهذه الحالة تعتمد النتيجة على درجة الخطر للعدو بفيروس HIV، لذلك شخص تحتخط رخصتكو نتيجة الاختبار غير محددة بنسبة 1\5000 أي 0,02%



لكنا لأشخاص عالية الخطر يمكن أن تكون نتيجة غير محددة فقط فالمراحل الأولى وللمن العدو وبعده ذلك يصبح إيجابى .  
النتيجة الغير محددة تحدث بنسبة نادرة فبالأشخاص لأصحاء والتى يكون اختبارهم غالباً سلبى .  
فحالة النتيجة الغير محددة لابد من إعادة الاختبار وفترة انتظار النتيجة لابد من الوقاية لمنع انتشار العدوى، مثلاً استعمال العازل الطبي معاً  
شريك جنسى، تجنب استعمال مواد الحلاقة وفرش الأسنان مع الآخرين، عدم تبادل لابر المحاقن فحالة عدم من المخدرات .

---

RIFERIMENTI: <http://www.uptodate.com>

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mariam El Gendi

**ملاحظات:** هذه الوثيقة تعرض المعلومات فقط وليس المقصد منها أن تحل محلما يقرره الطبيب. وأيضاً، لأنك الوثيقة تتطلب تحديثها بانتظام من حين لآخر.