

TUBERCOLOSI. FATTORI DI RISCHIO

Questionario

Soggetti ad alto rischio di sviluppare Tuberculosis rientrano in due categorie:

- Persone recentemente infettate dal batterio della Tuberculosis
- Persone con patologie che riducono l'efficienza del Sistema Immunitario

Persone di recente infettate dal batterio della Tuberculosis

Comprendono:

- Contatti stretti di una persona con malattia Tuberculare contagiosa
- Immigrati provenienti da Paesi con alti tassi di Tuberculosis
- Bambini di età < 5 anni con un test tubercolare positivo
- Gruppi con elevati tassi di trasmissione tubercolare: senzatetto, tossicodipendenti, persone con infezione da HIV
- Soggetti che lavorano o risiedono in strutture frequentate da persone ad alto rischio per Tuberculosis: ospedali, dormitori per senzatetto, istituti di pena, residenze assistite o per soggetti HIV positivi

Persone con patologie che riducono l'efficienza del Sistema Immunitario

Lattanti e bambini spesso hanno un Sistema Immunitario relativamente debole. Altre persone possono trovarsi nella stessa condizioni perché affette da qualcuna delle seguenti patologie:

- Infezione da HIV
- Abuso di sostanze
- Silicosi
- Diabete mellito
- Malattia renale cronica
- Basso peso corporeo
- Trapianto d'organo
- Cancro di capo e collo
- Trattamento con corticosteroidi o trapianto d'organo
- Trattamento dell'artrite reumatoide con farmaci specifici o della malattia di Crohn.

RIFERIMENTI

TB. Risk factors. <https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/risk.htm>