


# CANCRO DELLA CERVICE

## DI CHE COSA SI TRATTA?

Il cancro della cervice uterina (o collo uterino) colpisce l'estremità inferiore dell'utero in diretto collegamento con la vagina. È il terzo più comune cancro ginecologico. È causato dal Virus del Papilloma Umano **HPV**, presente nella quasi totalità dei casi (99,7%). La sua diffusione è molto diversa tra Paesi in Via di Sviluppo, dove si trovano due terzi dei casi, e Paesi industrializzati, dove si è ottenuta una importante riduzione grazie alla diffusione dello screening che permette di scoprire precocemente l'esistenza del tumore e di curarlo adeguatamente.



## QUALI SONO I SINTOMI?

I sintomi sono assenti o aspecifici: perdite di sangue anomale (dopo un rapporto sessuale, tra due cicli mestruali, in menopausa), perdite vaginali senza sangue, dolore durante il rapporto sessuale. È un tumore mortale se non diagnosticato in fase iniziale.

## CHI È A RISCHIO PER QUESTO TUMORE?

Tutte le donne tra i 21 e i 65 anni sono a rischio a causa della potenziale esposizione ad HPV tramite i rapporti sessuali, in quanto il virus infetta la pelle e le mucose genitali di entrambi i sessi. Altri fattori di rischio sono: l'Infezione da HIV, un sistema immunitario indebolito, l'esposizione intrauterina al farmaco estrogenico DES, oggi raramente usato, un trattamento pregresso di una lesione precancerosa o un cancro cervicale

## IN CHE COSA CONSISTE LO SCREENING DEL CANCRO DELLA CERVICE?

Screening basato sul test citologico (PAP test) e la ricerca dell'HPV nel secreto vaginale		
Donne con età inferiore a 21 anni	Nessuno screening	<b>D</b>
Donne di età compresa tra 21 e 29 anni	PAP TEST ogni 3 anni	<b>A</b>
Donne di età compresa tra 30 e 65 anni	PAP TEST ogni 3 anni <b>o</b> Ricerca dell'HPV ogni 5 anni <b>o</b> PAP TEST + ricerca HPV ogni 5 anni	<b>A</b>
Donne di età > 65 anni	Stop allo screening se prive di fattori di rischio per cancro della cervice	<b>D</b>
Donne che hanno subito l'asportazione dell'utero, compresa la cervice, senza storia di pregressa lesione precancerosa o cancro alla cervice	Nessuno screening	<b>D</b>

## ESISTONO ALTRI MEZZI PER PREVENIRLO?

Dal 2007 è disponibile e raccomandato il vaccino anti- HPV.

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento: Novembre 2020

## RIFERIMENTI:

US Preventive Services Task Force, JAMA 2018;320(7):674-686.

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2697704>