



# 肝炎疫苗接种

## VACCINAZIONE ANTI EPATITE

### 抗乙型肝炎（HBV）疫苗接种

#### *Vaccinazione anti epatite B (ANTI HBV)*

抗乙肝病毒（HBV）疫苗应在婴儿期接种，为加强效果可在青春期时再种；感染乙肝病毒风险较高的人应加强接种。

乙肝疫苗接种由3针构成，第2针和第3针应分别在第1针之后1个月和6个月进行。建议接种的成人：

- 医护和公安人员
- 残疾人护理人员和监狱管理人员
- 慢性乙肝患者的家属和性伴侣
- 有多个性伴侣者、性病患者和同性恋者
- 吸毒者
- 进行输血和肾透析的人
- 来自乙肝高发国家的人
- 国际旅行者
- 19到59岁的糖尿病患者

对酵母过敏者不可接种乙肝疫苗。

预防新生儿乙肝病毒感染

如果母亲为HbsAg阳性，对新生儿必须进行下列处置：

出生后立即注射：

- 一剂乙肝抗体。抗体会立即发挥保护作用，但只能持续几个月。
- 乙肝疫苗。共3剂：第1剂在出生时，其它2剂在1个月和6个月时。为保证接种的有效性，必须按时完成所有3剂的注射。

在第9到第18个月间，应进行乙肝抗体检测，若结果为阴性必须注射第4剂。



### 抗甲型肝炎（HAV）疫苗接种

#### *Vaccinazione anti epatite A (ANTI HAV)*

甲肝是儿童和青少年的常见传染病。婴儿被传染时不易发现，成年人被传染时症状类似流感，只有在少数严重情况下会表现出肝病症状。

在儿童期接种甲肝疫苗可以保护医护人员免遭传染。

甲肝疫苗接种由2针组成，之间间隔6到12个月。若第2针未按时注射，必须从头开始重复一个完整的接种周期。

注射后针眼处发红、疼痛为常见现象。

A甲肝疫苗接种的建议人群为12到23个月儿的婴儿和属于“高风险”的成年人，包括：

- 去甲肝高发国家的旅行者
- 非法毒品使用者，不论是以注射方式还是非注射方式
- 同性恋者
- 慢性肝病患者
- 有血凝问题的成年人
- 因工作原因有被传染风险的成年人，比如幼儿园和医疗机构工作人员，或餐饮从业人员。

#### 孕期甲肝疫苗接种

目前没有孕妇对甲肝疫苗不良反应的报告，对胎儿的影响也应为极低。不过，对于有问题的怀孕应具体问题具体分析。

---

**RIFERIMENTI:** <http://www.uptodate.com>

**PROGETTO:** “ELISA. Educare e informare sulla salute”. Aggiornamento: gennaio 2015.

**TRADUZIONE:** Bi Xu

**备注:** 此文件只是提供健康资讯，不能代替医生的诊断和建议。此外，如同任何刊物，内容需不断更新