VACCINAZIONE ANTI - MORBILLO

Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa, diffusa in tutto il mondo, caratterizzata dalla comparsa e diffusione di piccole macchie rosso-bruno, talora pruriginose, sulla pelle di tutto il corpo (esantema). Prima della vaccinazione di massa, era tipicamente una malattia dell'infanzia.

Dopo un esordio con sintomi aspecifici di raffreddore, compare febbre alta, tosse, spossatezza, malessere diffuso. Infine, la comparsa dell'esantema rende facile la diagnosi.

La malattia di solito si risolve spontaneamente senza farmaci (a parte quelli per alleviare i sintomi), ma può essere frequentemente seguita da complicanze quali otite, laringite, broncopolmonite e, soprattutto, encefalite. Quest'ultima può portare a morte nel 15% dei casi e provocare danni permanenti come epilessia, sordità, ritardo mentale nel 40%. Una complicanza rara, ma gravissima, è la PESS (Panencefalite Sclerosante Subacuta), malattia neurologica ad esito infausto che si manifesta a distanza di anni dopo la prima infezione, per la persistenza del virus nel tessuto cerebrale.

IL VACCINO	Il vaccino contiene il virus del morbillo attenuato, cioè reso inoffensivo. L'immunità indotta è efficace (>90%) e a lungo termine. È ben tollerato. Gli effetti indesiderati più comuni possono essere: dolore e gonfiore nel sito di iniezione, febbricola, blanda eruzione cutanea (quasi l'imitazione ridotta della malattia) e artralgia (negli adulti). In casi molto rari (1-2/10.000) si possono avere reazioni più severe, come convulsioni febbrili.
SOMMINISTRAZIONE	• Bambini (**obbligatorio**). Una dose per via intramuscolare nella coscia o nel braccio, a 12-15 mesi. • Soggetti suscettibili*, in caso di necessità: Due dosi per via intramuscolare, distanziate di almeno 4 settimane.
RICHIAMO	• Bambini, seconda dose a 5-6 anni. • Adolescenti non vaccinati: una dose a 11-18 anni (catch up) Non necessari ulteriori richiami

*Non vaccinati e non immuni in seguito alla malattia. Lo stato immunitario del soggetto è eventualmente accertabile mediante ricerca degli anticorpi antimorbillo nel sangue.

In Italia il vaccino è somministrato in associazione con uno o più dei seguenti vaccini: Parotite, Rosolia, Varicella: MPR (trivalente), MPRV (tetravalente).

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30		
Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@aslcittaditorino.it vaccinazioni@aslcittaditorino.it

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Febbraio 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto