

VACCINAZIONE ANTI- ROSOLIA

La rosolia è una malattia virale con quadro clinico modesto nei bambini, caratterizzato da un esantema a piccole macchie rosse diffuse sulla pelle, talora con ingrossamento dei linfonodi del collo e congiuntivite.

L'adulto può avere artralgie.

Complicanza possibile, ma non frequente, è la trombocitopenia, cioè la diminuzione del numero di piastrine. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la malattia passa del tutto inosservata, pur rimanendo altamente contagiosa.

Se la vittima del contagio è una donna in gravidanza, si possono verificare aborto o gravi anomalie fetali. Il neonato che manifesta la Sindrome da Rosolia Congenita può presentare gravi problemi cardiaci, cecità, sordità, ritardo mentale e altro. La **vaccinazione è fondamentale** per la prevenzione.



IL VACCINO	Il vaccino contiene il virus della rosolia attenuato, cioè reso inoffensivo. L'immunità indotta è efficace (>90%) e a lungo termine. Il vaccino è ben tollerato. Eventuali effetti avversi compaiono a distanza di 7-14 giorni dalla vaccinazione e sono transitori: febbre, esantema fugace, ingrossamento dei linfonodi. Rari sono le convulsioni febbrili e la transitoria diminuzione del numero di piastrine (trombocitopenia).
SOMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Bambini (obbligatorio). Una dose intramuscolare, nella coscia o nel braccio, a 12-15 mesi.• Donne suscettibili* (fortemente raccomandato) prima di programmare una gravidanza o subito dopo il parto, per proteggerle dall'infezione in gravidanze successive: 2 dosi per via intramuscolare distanziate di almeno 4 settimane.
RICHIAMO	<ul style="list-style-type: none">• Bambini, seconda dose a 5-6 anni.• Adolescenti non vaccinati: una dose a 11-18 anni (catch up). Non necessari ulteriori richiami.

*Non vaccinate e non immuni in seguito alla malattia. Lo stato immunitario del soggetto è accertabile mediante ricerca degli anticorpi antimorbillo nel sangue.

In Italia esiste il vaccino singolo. Nei bambini è somministrato in associazione con uno o più dei seguenti vaccini: Morbillo, Parotite, Varicella: MPR (trivalente), MPRV (tettrivalente).

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30		
Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@ascittaditorino.it vaccinazioni@ascittaditorino.it

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Febbraio 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.

<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto>