


# CANCER DU COL DE L'UTERUS

## Dépistage

### DE QUOI S'AGIT-IL?

Le cancer du col de l'utérus atteint l'extrémité inférieure du col de l'utérus en liaison directe avec le vagin. Il s'agit du troisième cancer gynécologique le plus commun. Il est provoqué par le virus du Papillome Humain **HPV**, présent dans presque la totalité des cas (99,7%). Sa diffusion est très différente selon s'il s'agit de pays en voie de développement où l'on relève deux tiers des cas par rapport aux pays industrialisés où on a obtenu une réduction importante de cas suite à la diffusion d'un dépistage permettant de découvrir précocement l'existence d'une tumeur et de la soigner de façon adéquate.



### QUELS SONT LES SYMPTOMES?

Les symptômes sont absents ou non spécifiques : pertes de sang anormal (après un rapport sexuel entre deux cycles menstruels, en ménopause), pertes vaginales sans écoulement sanguin, douleur pendant le rapport sexuel. Il s'agit d'une tumeur mortelle si elle n'est pas diagnostiquée à la phase initiale.

### QUI EST A RISQUE FACE A CETTE TUMEUR ?

Toutes les femmes allant de 21 à 65 ans sont à risque parce qu'elles sont exposées potentiellement au HPV par l'intermédiaire des rapports sexuels car le virus infecte la peau et les muqueuses génitales des deux sexes. D'autres facteurs de risque sont : l'infection due au SIDA, un système immunitaire affaibli, exposition intra-utérine au médicament œstrogène DES, rarement utilisé aujourd'hui, un traitement précédent d'une lésion précancéreuse ou d'un cancer cervical.

### EN QUOI CONSISTE LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS ?

Dépistage basé sur test cytologique (PAP test) et la recherche de HPV dans la sécrétion vaginale	
Femmes âgées de moins de 21 ans	Aucun dépistage
Femmes âgées de 21 à 29 ans	PAP TEST tous les 3 ans
Femmes âgées de 30 à 65 ans	PAP TEST tous les 3 ans ou Recherche du HPV tous les 5 ans <b>ou</b> PAP TEST + recherche HPV tous les 5 ans
Femmes âgées de > 65 ans	Stop au dépistage si privées de tout risque face au cancer du col de l'utérus
Femmes ayant subi l'ablation de l'utérus, compris le col sans avoir un historique de précédente lésion précancéreuse ou cancer du col de l'utérus	Aucun dépistage

### EXISTE-T-IL D'AUTRES MOYENS POUR LE PREVENIR ?

Depuis 2007 le vaccin anti-HPV est recommandé et disponible.

Aux bons soins de: dott.ssa Maddalena Saitta

Traduction : Anne Marie Tefnin

Mise à jour: Novembre 2020

### REFERENCES:

US Preventive Services Task Force, JAMA 2018;320(7):674-686.

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2697704>