

QUESTIONNAIRE

Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) & HIV

FACTEURS DE RISQUE POUR MST & HIV (Barrer l'article qui intéresse)

- Demande d'effectuer le test
- Rapports homosexuels sans préservatif de temps à autre Sexuellement active avec partenaire/s femme/s
- Le partenaire a eu MST
- L'année dernière, rapports sexuels avec un nouveau partenaire
- L'année dernière, rapports sexuels avec plusieurs partenaires
- L'année dernière, le partenaire a eu d'autres partenaires
- Impliqué/e dans la prostitution/habitudes dans l'échange sexuel
- Faire usage de stupéfiants
- Anamnèse positive à MST
- Transfusions de sang entre 1978 et 1985
- Femme en état de grossesse qui ne connaît pas le sérum de son propre état.

CHLAMYDIA ET BLENNORRAGIE :

Le dépistage est recommandé à:

- Femmes et hommes âgés de ≤ 24 ans (mais aussi plus âgés) susceptibles de risque plus élevé (voir liste)
- Femmes enceintes, compris celles qui arrivent à l'accouchement sans connaître l'état de leur sérum.

Quand répéter le dépistage:

- *Adultes des deux sexes à risque* : répéter tous les ans
- *Femme enceinte à risque* : dépistage pendant la première consultation prénatale. Si les conditions de risque continuent, répéter le dépistage pendant le troisième trimestre.

SIDA

Le dépistage est recommandé aux :

- Adolescents et adultes à risque plus élevé (voir liste)
- Femmes enceintes compris celles qui arrivent à l'accouchement sans connaître l'état de leur sérum.

Traduzione. Dott.ssa Anne Marie Tefnin

RIFERIMENTI

The Guide to Clinical Preventive Services 2014". <http://www.ahrq.gov>

ASPIC ODV Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso

Sede c/o Centro SERVIZI Vol.To, Via Giolitti 21, 10123 Torino

CF. 97574720013 www.aspicodv.com +39 3343898714 info@aspiconlus.it

