

VACCINAZIONE ANTI HERPES-ZOSTER

L'Herpes Zoster (**HZ**), detto popolarmente "Fuoco di Sant'Antonio", è causato dallo stesso virus della Varicella (VZV), che resta latente a livello dei gangli dei nervi sensoriali e può riattivarsi, anche a distanza di molti anni dall'infezione primaria.

La manifestazione clinica tipica è un'eruzione cutanea di bolle e vescicole, la cui disposizione disegna il decorso dei nervi sensitivi, solitamente a livello del torace, come una fascia limitata ad un solo lato del tronco. Il trattamento con antivirali per bocca (acyclovir e simili), iniziati possibilmente entro 24 ore dall'insorgenza dei sintomi, porta generalmente alla guarigione nel giro di qualche giorno.

Il dolore intenso e urente della fase acuta può lasciare il posto, dopo la risoluzione, alla neuropatia post-erpetica (**NPH**): parestesie, prurito talora intenso, sensazione di disagio, dolore cronico, che possono perdurare per mesi senza poter essere guariti.

Tra le altre localizzazioni di HZ, è temibile quella che coinvolge la branca oftalmica del nervo Trigemino, particolarmente dolorosa e possibilmente esitante in cecità se non curata tempestivamente.

L'incidenza, la severità e le complicazioni dell'HZ aumentano notevolmente con l'avanzare dell'età, a partire dai 50 anni.

La vaccinazione induce una risposta immunitaria che controlla la riattivazione e la replicazione virale.



ATTENTI AL FUOCO!
(di Sant'Antonio)

IL VACCINO	<p>v1. Vaccino a virus della Varicella attenuato. Efficacia a 50 anni: 70% per la malattia (41% >70 anni) e 65% per la PNH Nome commerciale ZONTAVAX</p> <p>v2. Vaccino ricombinante adiuvato. Efficacia a 50 anni: 97% per la malattia (91% >70 anni) e 100% per la PNH (70% >70 anni) Nome commerciale SHINGRIX</p>
SOMMINISTRAZIONE	<p>v1. Adulti =>50 anni, inclusi quelli che hanno già avuto HZ: una dose unica, sottocute</p> <p>v2. Adulti =>50 anni, inclusi quelli che hanno già avuto HZ e quelli che sono stati vaccinati con il vaccino precedente; adulti > 18 anni a rischio di HZ (diabete, patologia cardiovascolare, BCPO, immunodepressione) due dosi distanziate di 2 mesi.</p> <p>Per mancanza di dati, entrambi i vaccini non sono consigliati nelle donne in gravidanza. Una eventuale gravidanza dovrebbe essere iniziata almeno 4 settimane dopo la vaccinazione contro HZ.</p>

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.		
Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30		
Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@aslcittaditorino.it vaccinazioni@aslcittaditorino.it

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Marzo 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.

<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto>