

## VACCINAZIONI ESTEMPORANEE-2

Per vaccinazioni estemporanee si intende un gruppo di vaccinazioni che non sono somministrate routinariamente su larga scala alla popolazione generale per salvaguardarne lo stato di salute, ma a singoli individui in circostanze e momenti particolari. Un esempio sono le **vaccinazioni per i viaggiatori**, condizionate dalla situazione epidemiologica e dalle leggi dei Paesi verso i quali si è diretti, oppure da condizioni di pericolo individuale, quale il **contatto stretto con malati** di malattie non endemiche nel proprio Paese, o il **lavoro a rischio** (personale sanitario e di laboratorio che opera nella ricerca e cura di particolari malattie).



**EPATITE A:** malattia virale (HAV) benigna del fegato, caratterizzata da ittero, astenia, nausea per alcune settimane o più, in alcuni casi asintomatica (bambini), e molto raramente fulminante. NON cronicizza mai. Si contrae tramite ingestione di acqua, succhi e alimenti crudi o non sufficientemente cotti (insalate, frutta non sbucciata, frutti di mare, cubetti di ghiaccio) e contaminati.

- **Dove.** Paesi dell’Africa, Asia (compresa Turchia), del Bacino del Mediterraneo, Europa dell’est, Medio Oriente, Centro e Sud America, in aree con bassi livelli igienico-sanitari e assenza di fognature.
- **Vaccino:** virus ucciso, 2 dosi a 6 mesi una dall’altra per via intramuscolare.

**ENCEFALITE GIAPPONESE:** malattia virale trasmessa dalle zanzare. Per lo più asintomatica e benigna; in taluni casi evolve in una grave forma neurologica con mortalità del 20-30% e, nei sopravvissuti, alta probabilità di danni neurologici invalidanti permanenti.

- **Dove.** Paesi dell’Estremo oriente, Subcontinente Indiano, parte dell’Oceania (isole del Pacifico). In aree rurali umide e acquose (risaie), dove gli uomini convivono con animali da cortile e suini.
- **Vaccino:** Virus inattivato; due dosi a distanza di 4 settimane, da completare almeno una settimana prima di arrivare nel Paese di destinazione.

**ENCEFALITE DA ZECCHIE:** Malattia di encefalo e meningi, causata da un virus trasmesso dalle zecche, con mortalità attorno a 1%, e possibilità di residui neurologici invalidanti.

- **Dove.** Stati Baltici, Slovenia e Russia, in aree rurali e forestali fino a 1400 mt. di altitudine.
- **Vaccino:** Virus inattivato; tre dosi (4-12 settimane tra prima e seconda, 9-12 mesi tra seconda e terza), per via intramuscolare.

### TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

**Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.**

**Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30**

Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@ascittaditorino.it vaccinazioni@ascittaditorino.it
----------	-----------------------------	--

- A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Aprile 2021

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI:** IL GIRO DEL MONDO. OSP. AMEDEO DI SAVOIA, Torino,

SC Malattie infettive e Tropicali, SS Medicina dei Viaggi. <http://www.ilgirodelmondo.it/vaccinazioni-1.html>