

Infezione da Chlamydia e da Gonococco Screening

Che cosa bisogna sapere sulle infezioni da Chlamydia e da Gonococco?

Chlamydia e Gonorrea sono Infezioni Trasmesse Sessualmente, generalmente in rapporti sessuali non protetti. È anche possibile la trasmissione materno-fetale.

I fattori di rischio sono: rapporti sessuali con un partner sconosciuto, o un partner infetto, o più partner; non utilizzare il condom; avere avuto una IST pregressa; commercializzare il sesso.

La **donna** può non manifestare alcun sintomo; il mancato trattamento può portare a gravi complicazioni, tra cui gravidanza extra-uterina e perdita della fertilità.

Il **neonato** infettato dalla madre può sviluppare una polmonite da Chlamydia o Gonococco, o problemi oftalmici da Chlamydia.

Nell'**uomo** le stesse infezioni sono più frequentemente sintomatiche, specialmente la gonorrea: è pertanto meno probabile che nell'uomo si verifichino complicanze, poiché cerca le cure.



In che cosa consiste lo screening?

Si utilizzano test molecolari di ricerca dell'acido nucleico rispettivo dei due agenti infettivi, in campioni prelevati dall'apparato urogenitale – vagina ed endocervice nelle donne, uretra nei maschi – ed extragenitali: urina, intestino retto, faringe. Si consiglia di sottoporsi allo screening quando compare o persiste un fattore di rischio nella vita sessuale.

Quali sono i benefici e quali gli effetti negativi dello screening?

Obiettivo dello screening è che le persone risultate positive possano ricevere un adeguato **trattamento antibiotico**. Lo screening permette di identificare le donne asintomatiche che, curate, evitano le complicanze correlate al progredire della malattia.

Non vi sono invece evidenze per raccomandare lo screening nell'uomo.

Effetti negativi dello screening sono rari: al più stato d'ansia e di apprensione nelle relazioni.

A chi è raccomandato lo screening?

Alla luce delle attuali conoscenze, lo screening per l'infezione da Chlamydia e da Gonococco è raccomandato a donne asintomatiche sessualmente attive di età ≤ 24 anni, e >24 anni se con fattori di rischio. Sebbene la prevalenza di Chlamydia e gonorrea sia diversa, si raccomanda di eseguire lo screening per i due agenti infettivi **contemporaneamente**, dato che i fattori di rischio si possono sovrapporre. Le raccomandazioni non sono applicabili al sesso maschile per mancanza di dati.

RIFERIMENTI

USPSTF, Chlamydia and Gonorrhoea: Screening. *JAMA*. September 2021; 326(10):949-956.

doi:10.1001/jama.2021.14081

<https://uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/chlamydia-and-gonorrhoea-screening>

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento: ottobre 2021

ASPIC ODV Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso
Sede c/o Centro SERVIZI Vol.To, Via Giolitti 21, 10123 Torino
CF. 97574720013 www.aspicodv.com +39 3343898714 aspicodv@gmail.com

